




نام درس: حسابان
نام دبیر:
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

جمهوری اسلامی ایران

نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته: یازدهم ریاضی
نام پدر:
شماره داوطلب:
تعداد صفحه سؤال: ۲ صفحه

ردیف	سؤالات	محل مهر یا امضاء مدیر	نمره
۱	در یک دنباله هندسی نزولی هر جمله ی آن، نصف مجموع تمام جملات بعدی است، قدر نسبت این دنباله را بیابید.		۱
۲	در یک دنباله هندسی نزولی، مجموع مجذورات تمام جملات، برابر $\frac{2}{3}$ مجذور مجموع تمام جملات آن است. قدر نسبت این دنباله را بیابید.		۱
۳	دو تابع $f = \{(2,5), (6,3), (3,7), (4,1), (1,9)\}$ و $g(x) = \frac{x}{x-1}$ مفروض اند. اگر $f^{-1}(g(2a)) = 6$ باشد، a را به دست آورید.		۱
۴	از دو معادله ی دو مجهولی $2^{x-y} \times 4^{x+y} = 1$ و $\log y = 2 \log 3 + \log x$ مقدار y را به دست آورید.		۱/۵
۵	مجموعه جواب نامعادله ی $3 < \frac{3x+1}{x-3} < -1$ را به دست آورید.		۱
۶	اگر $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$ و $g(x) = \frac{2x+2}{2-x}$ باشند، ضابطه ی تابع $g(f(x))$ را به دست آورید.		۱
۷	حاصل حدهای زیر را به دست آورید.		
۱/۲۵	A) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{6}{x^2 - 2x} - \frac{x+1}{x-2} \right)$		
۱/۵	B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos 3x} - \sqrt{\cos x}}{x^2}$		
۱/۲۵	C) $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{x}{x+1} \right)$		
۱	D) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{x}$		
۸	تابع با ضابطه ی $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1-\sqrt{1-x}} & ; x \neq 0 \\ a & ; x = 0 \end{cases}$ ، به ازای چه مقدار a در نقطه ی به طول $x = 0$ پیوسته است؟		۱
۹	از دو معادله ی $\ln(2x+1) + \ln(y-2) - \ln y = \ln 3$ و $\ln(2y-3x) + \ln 2 = 0$ مقدار xy را به دست آورید.		۱
۱۰	از دو معادله ی دو مجهولی $3^{2x+y} = 9 \times 3^{x-y}$ و $\log(x+2y) = 1 + \log y$ مقدار x را به دست آورید؟		۱
۱۱	اگر عبارت $\sqrt[4]{\frac{2}{x^2} - \frac{9}{2}} + \sqrt[3]{2x - x^2}$ ، عدد حقیقی باشد، مجموعه مقادیر x را به صورت بازه نمایش دهید؟		۱
۱۲	اگر $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$ و انتهای کمان α در ربع چهارم باشد، مقدار $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$ را بدست آورید.		۱/۵
۱۳	اگر $f(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2}$ و $g(x) = \sqrt{x-x^2}$ باشند، دامنه ی تعریف تابع $g \circ f$ ، را به دست آورید.		۱/۵

ردیف	ادامه ی سؤالات	محل مهر یا امضاء مدیر	تاریخ
۱۴	شکل روبه‌رو قسمتی از نمودار تابع $y = \frac{1}{3} + 2\cos mx$ است. مقدار تابع را در نقطه‌ای به طول $x = \frac{16\pi}{3}$ بدست آورید. 		۱/۵
صفحه ی ۲ از ۲			

موفق باشید. جمع بارم : ۲۰ نمره



نام درس: مسابان

نام دبیر:

تاریخ امتحان:

ساعت امتحان:

مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

کلید سؤالات پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	$a_1 = \frac{1}{r}(a_r + a_r + \dots), \quad S_{\text{حد}} = \frac{a_1}{1-q}$ $a_1 = \frac{1}{r} \times \frac{a_r}{1-q} \rightarrow a_1 = \frac{1}{r} \times \frac{a_1 q}{1-q} \rightarrow 1 = \frac{q}{r-2q} \rightarrow q = r-2q \rightarrow 3q = r \rightarrow q = \frac{r}{3}$	
۲	$S_{\text{حد}} = \frac{a_1}{1-q}$ $a_1, a_r, a_r, \dots \rightarrow a_1, a_1 q, a_1 q^2, \dots$ $a_1^r, a_1^r, a_1^r, \dots \rightarrow a_1^r, a_1^r q^r, a_1^r q^{2r}, \dots$ $\text{مجموع مجذورات تمام جملات} = \frac{r}{3} \left(\text{مجموع مجذورات تمام جملات} \right) \rightarrow \frac{a_1^r}{1-q^r} = \frac{r}{3} \left(\frac{a_1}{1-q} \right)^r$ $\frac{a_1^r}{(1-q)(1+q)} = \frac{r}{3} \times \frac{a_1^r}{(1-q)^r} \rightarrow \frac{1}{1+q} = \frac{r}{3(1-q)} \rightarrow 3-3q = r+2q \rightarrow q = \frac{1}{5}$	
۳	می‌دانیم اگر $f(a) = b$ باشد، آن‌گاه $f^{-1}(b) = a$ است. $f^{-1}(g(2a)) = f(e) = g(2a) \rightarrow 3 = \frac{2a}{2a-1} \rightarrow 6a-3 = 2a \rightarrow a = \frac{3}{4}$	
۴	$2^{x-7} \times 4^{x+y} = 1 \rightarrow 2^{x-7} \times (2^2)^{x+y} = 1 \rightarrow 2^{x-7+2x+2y} = 1 \rightarrow 2^{3x+2y-7} = 1$ $3x + 2y - 7 = 0$ $\log y = 2 \log 3 + \log x \rightarrow \log y = \log 9 + \log x \rightarrow \log y = \log 9x \rightarrow y = 9x$ $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ y = 9x \end{cases} \rightarrow 3x + 18x = 7 \rightarrow 21x = 7 \rightarrow x = \frac{1}{3}, y = 9\left(\frac{1}{3}\right) = 3$	
۵	نامعادله‌ی داده شده را به دو نامعادله تبدیل کرده و از جواب‌های آن‌ها اشتراک می‌گیریم: $\frac{3x-1}{x-3} > -1 \rightarrow \frac{3x-1}{x-3} + 1 > 0 \rightarrow \frac{3x+1+x-3}{x-3} > 0 \rightarrow \frac{4x-2}{x-3} > 0$ $\frac{x}{\text{عبارت}} \quad \begin{array}{c cccc} -\infty & \frac{1}{4} & 3 & +\infty \\ \hline & + & - & + \end{array} \rightarrow x < \frac{1}{4} \text{ یا } x > 3 \quad (I)$ $\frac{3x-1}{x-3} < 3 \rightarrow \frac{3x-1}{x-3} - 3 < 0 \rightarrow \frac{3x+1-3x+9}{x-3} < 0 \rightarrow \frac{10}{x-3} < 0 \rightarrow x < 3 \quad (II)$ از اشتراک I و II به جواب $x < \frac{1}{4}$ می‌رسیم.	
۶	$g(f(x)) = \frac{2\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) + 2}{2 - \left(\frac{2x-1}{x+1}\right)} = \frac{\frac{4x-2+2x+2}{x+1}}{\frac{2x+2-2x+1}{x+1}} = \frac{6x}{3} = 2x$	
۷	A) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{6}{x^2 - 2x} - \frac{x+1}{x-2} \right) = \frac{0}{0} \Rightarrow HOP: \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{-2x-1}{2x-2} \right) = \frac{-4-1}{4-2} = -\frac{5}{2}$ B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos 3x} - \sqrt{\cos x}}{x^2} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \frac{9}{2}x^2} - \sqrt{1 - \frac{1}{2}x^2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{4}x^2}{x^2} = -\frac{1}{4}$	

$C) \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{x}{x+1} \right) = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{2}{(x+1)(x-1)} - \frac{x}{x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{2 - x^2 + x}{x^2 - 1} \right) = \frac{0}{0}$ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-(x-2)(x+1)}{(x-1)(x+1)} = -\frac{3}{2}$ $D) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{(\sqrt{x})^2}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$	
شرط اینکه تابع f در $x = a$ پیوسته باشد، آن است که حد راست و حد چپ و مقدار تابع در $x = a$ موجود و متناهی و با هم برابر باشند. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - \sqrt{1-x}} = \frac{0}{0} \Rightarrow HOP: \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1(-1)}{2\sqrt{1-x}}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$ $f(0) = a$ پس $a = 2$ است.	۸
$\ln(2x+1) + \ln(y-2) - \ln y = \ln 3 \rightarrow \ln \frac{(2x+1)(y-2)}{y} = \ln 3 \rightarrow \frac{(2x+1)(y-2)}{y} = 3$ $2xy - 4x + y - 2 = 3y \rightarrow 2xy = 4x + 2y + 2(I)$ $\ln(2y-3x) + \ln 2 = 0 \rightarrow \ln(4y-6x) = 0 \Rightarrow (\ln 1 = 0) \Rightarrow 4y - 6x = 1 \Rightarrow y = \frac{1+6x}{4}$ با جایگذاری y در رابطه‌ی (I) داریم: $2x\left(\frac{1+6x}{4}\right) = 4x + 2\left(\frac{1+6x}{4}\right) + 2 \rightarrow \frac{x+x^2}{2} = 4x + \frac{1+6x}{2} + 2 \Rightarrow 6x^2 - 13x - 5 = 0$ $\Delta = b^2 - 4ac = 169 + 120 = 289 \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{13+17}{12} = \frac{5}{2} & \text{ق.ق} \\ x_2 = \frac{13-17}{12} = -\frac{1}{3} & \text{غ.ق.ق} \end{cases}$ $y = \frac{1+6x}{4} \Rightarrow y = \frac{1+15}{4} = 4 \Rightarrow xy = \left(\frac{5}{2}\right)(4) = 10$	۹
$3^{2x+y} = 9 \times 3^{x-y} \rightarrow 3^{2x+y} = 3^2 \times 3^{x-y} \rightarrow 3^{2x+y} = 3^{2+x-y} \Rightarrow x = 2-2y$ $\log(x+2y) = 1 + \log y \rightarrow \log(x+2y) = \log 10 + \log y \rightarrow \log(x+2y) = \log 10y$ $x+2y = 10y \rightarrow x = 8y \Rightarrow (x = 2-2y) \Rightarrow 2-2y = 8y \rightarrow 10y = 2 \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{10} \\ x = 8y \Rightarrow x = \frac{16}{10} \end{cases}$	۱۰
چون یک چندجمله‌ای در زیر رادیکال با فرجه‌ی فرد قرار دارد، بنابراین رادیکال با فرجه‌ی فرد به ازای تمام مقادیر x تعریف شده است و فقط باید عبارت زیر رادیکال با فرجه‌ی زوج را بزرگ‌تر مساوی صفر قرار دهیم. $-\frac{9}{2} \geq 0 \rightarrow \frac{4-9x^2}{2x^2} \geq 0 \rightarrow \begin{cases} \text{صورت} = 0 \rightarrow 9x^2 = 4 \rightarrow x^2 = \frac{4}{9} \rightarrow x = \pm \frac{2}{3} \\ \text{مخرج} = 0 \rightarrow 2x^2 = 0 \rightarrow x = 0 \end{cases}$	۱۱
$\cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \cos\frac{\pi}{4}\cos\alpha + \sin\frac{\pi}{4}\sin\alpha - \left(\cos\frac{\pi}{4}\cos\alpha - \sin\frac{\pi}{4}\sin\alpha\right)$ $\cos\frac{\pi}{4}\cos\alpha + \sin\frac{\pi}{4}\sin\alpha - \cos\frac{\pi}{4}\cos\alpha + \sin\frac{\pi}{4}\sin\alpha = 2\sin\frac{\pi}{4}\sin\alpha \Rightarrow 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\sin\alpha = \sqrt{2}\sin\alpha$	۱۲

$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{7}{9} = \frac{2}{9} \rightarrow \sin \alpha = \pm \frac{\sqrt{2}}{3} \Rightarrow \sin \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{3}$ در ربع چهارم $\sin$ منفی $\Rightarrow \sin \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{3}$ $\Rightarrow \sqrt{2} \sin \alpha = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}\right) = -\frac{2}{3}$	
ابتدا دامنه تعریف دو تابع f و g را به دست می آوریم. $f(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$ $g(x) = \sqrt{x-x^2} \Rightarrow D_g: x-x^2 \geq 0 \rightarrow x(1-x) \geq 0 \rightarrow 0 \leq x \leq 1$ تعیین علامت $\rightarrow 0 \leq x \leq 1$ $g \circ f = \left\{ x \in D_f, f(x) \in D_g \right\} = \left\{ x \neq \pm 1, x \neq -1, 0 \leq \frac{1+x^2}{1-x^2} \leq 1 \right\} \quad (I)$ $\frac{1+x^2}{1-x^2} \geq 0 \rightarrow 1-x^2 > 0 \rightarrow x^2 < 1 \rightarrow -1 < x < 1 \quad (II)$ $\frac{1+x^2}{1-x^2} \leq 1 \rightarrow \frac{1+x^2}{1-x^2} - 1 \leq 0 \rightarrow \frac{1+x^2-1+x^2}{1-x^2} \leq 0 \rightarrow \frac{2x^2}{1-x^2} \leq 0 \quad (III)$ از اشتراک I, II, III به جواب $x = 0$ می رسیم.	۱۳
از روی شکل مشخص است که دوره تناوب برابر با 4π است. $T = \frac{2\pi}{ b } \rightarrow 4\pi = \frac{2\pi}{ m } \rightarrow 2 = \frac{1}{ m } \rightarrow m = \frac{1}{2}, m = -\frac{1}{2}$ چون $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ است فرقی نمی کند که $m = \frac{1}{2}, m = -\frac{1}{2}$ باشد. $y = \frac{1}{2} + 2 \cos mx \rightarrow y\left(\frac{16\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(\frac{1}{2} \times \frac{16\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + 2 \cos \frac{8\pi}{3}$ $y\left(\frac{16\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + 2 \cos\left(2\pi + \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + 2 \cos \frac{2\pi}{3} = \frac{1}{2} + 2\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$	۱۴
نام و نام خانوادگی مصحح :	جمع بارم : ۲۰
امضاء:	